



Hygieneplan	BT 2.8_01 Version 01
--------------------	--------------------------------

Änderungen gegenüber der letzten Fassung:

Tab.1.1 Hygieneplan/Personalhygiene

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Wer
Berufs- /Schutz- kleidung		<ul style="list-style-type: none"> • bedarfsmäßig • geschlossen halten • bei Kontamination/Verschmutzung wechseln 		Mitarbeiter
Händereinigung	<ul style="list-style-type: none"> • bei Bedarf • nach Verschmutzung 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme des Konzentrats aus Wandspender gründlich abspülen • mit Einmalhandtüchern abtrocknen 	geeignete Wasch- lotion	Mitarbeiter
Hygienische Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> • vor Arbeitsbeginn • nach Kontakt mit kontaminiertem Material • vor/nach Patientenkontakt 	<ul style="list-style-type: none"> • mind.3 ml Konzentrat mind. 30 Sek. in der trockenen Hände einreiben • wurden Hände sichtbar/merklich mit keimhaltigen Ausscheidungen kontaminiert, verschmutzte Stelle mit Desinfektionsmittelgetränkten Tupfer reinigen, anschließend hygienische Hautdesinfektion mit nachfolgender Händewaschung 	DGHM gelistetes Hautdesinfektions- mittel nach Anweisung der Kranken- haushygiene- nikers	Mitarbeiter
Einmal- handschuhe	<ul style="list-style-type: none"> • bei Infektionsgefahr 	<ul style="list-style-type: none"> • das Tragen von Einmalhandschuhen entbindet nicht von der hygienischen Händedesinfektion • unsterile Handschuhe sind zu tragen bei allen Tätigkeiten, bei denen ein Kontakt mit Blut, Blutbestandteilen, Körperflüssigkeiten oder Ausscheidungen zu erwarten sind. 		Mitarbeiter
Mundschutz	<ul style="list-style-type: none"> • bei Manipulationen an zentralvenösen Zugängen 	<ul style="list-style-type: none"> • Mundschutz nach einmaligem Gebrauch nicht wiederverwenden • Mundschutz alle 2 Std. wechseln 		Pflegepersonal Ärzte