



Hygieneplan/Patient	BT 2.8_02 Version 01
---------------------	-------------------------

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Wer?
Haut	vor Punktion	<input type="checkbox"/> mit sterilem Tupfer abwischen <input type="checkbox"/> erneut Desinfektionsmittel sprühen <input type="checkbox"/> abtrocknen lassen (Einwirkzeit beachten!) <input type="checkbox"/> Punktionsstelle nach Desinfektion nicht mehr berühren	DGHM gelistetes Hautdesinfektionsmittel s.o.	Pflegepersonal Ärzte
Manipulation an zentral-venösen Zugängen	vor u. nach Transfusionen und Infusionen	Verbindungsstelle d. Zuganges großflächig einsprühen u. steriles Lochtuch vor d. Öffnen d. Verbindungsstelle d. Zuganges unterlegen, erneut großflächig Desinfektionsmittel aufsprühen Mindesteinwirkzeit abwarten, vollkommen abtrocknen lassen nach Transfusion/Infusion frischen, sterilen Einwegstöpsel zum Verschließen d. Verbindungsstelle verwenden erneut großflächig einsprühen u. mit sterilem Tupfer abreiben, Zugang mit sterilem Verbandmaterial verbinden	DGHM gelistetes Hautdesinfektionsmittel steriles Einweg-Lochtuch	Pflegepersonal Ärzte

Hamburg, den

Autor