

	Ileo-Coloskopie: Befund	Anlage 02 GAE-DIA 03
---	--------------------------------	---------------------------------

Änderungen gegenüber der letzten Fassung:

1 Unterscheidung

Elektiv-Untersuchung

Notfalluntersuchung

2 Indikation der Untersuchung

3 Prämedikation und Überwachung

Die Untersuchung wurde durchgeführt unter Oxymetriekontrolle mit der prograden Optik

nach Prämedikation mit: mg Midazolam, mg Propofol,
mg Dolantin und mg Buscopan.

Dabei sank die registrierte SaO₂ nicht unter %.

4 Ausdehnung der Untersuchung

4a. Erreichen des Caecalpols

4b. Abbruch der Untersuchung

-Lokalisation (wo)

-Grund (wegen)

--geplant

--Schmerzen

--Verschmutzung

--Darmelongation

--Stenose oder Striktur

--Komplikationen.

5 Befund

5a. Normalbefund

Regelrecht spiegelnde intakte Colonmucosa mit unauffälliger Haustrierung im gesamten Colonrahmen.

5b. Divertikul(ose)

Ausprägung

einzel

mehrere

viele

Größe

klein
gross
verzweigt
fuchsbauartig)

Lokalisation

(mit P.m.in.....)

Lumeneinengung

Ja/nein

5c.Divertikulitis

Lokalisation

Mucosaaspekt

Rötung
Schwellung
Vulnerabilität
Petechien
Detritus
Eiteraustritt

Stenose

passierbar
ja/nein,
Länge in cm

5d.Polypen

Lokalisation

(im Rektosigmoid in cm ab ano,weiter proximal bezogen auf Darmabschnitt)

Anzahl

Größe

Form

(Knospe(<3mm)
gestielt
schmalbasig
breitbasig
rasenförmig

Oberfläche

intakt
erodiert

blutend

Therapie

Hot-PE,

Schlingenresektion

EMR, chirurgisch

V.a.Polyposis-Syndrom

Ja/nein

5e.Carcinom

Diagnosesicherheit

Verdacht auf

gesichert

Lokalisation

Passierbarkeit

nicht stenosierend

passierbar

nicht passierbar

Längsausdehnung

(in cm bzw.prox./dist.Rand)

Zirkumferenzausdehnung

(in % bezogen auf Gesamtumfang)

Wachstum

exophytisch

ulcerierend

beides

infiltrierend

villös

5f.Colitis

Diagnosesicherheit

Verdacht auf

gesichert bzw. bekannt

Lokalisation

Befallsmuster

gesamtes Colon

segmental

diskontinuierlich

kontinuierlich

Stenose

Länge in cm,
Passierbarkeit

Attribute einer Mucosaaffektion:

- Gefäßzeichnung
 - vermindert
 - rarefiziert
 - aufgehoben
- Rötung
 - diffus
 - fleckförmig)
- Schwellung
 - diffus
 - lokalisiert
 - lumeneinengend)
- Granularität
 - vorhanden
 - nicht vorhanden;
 - grob
 - fein
- Vulnerabilität
 - Spontanblutung
 - Kontaktblutungen
- Petechien
 - einzelne
 - wenige
 - viele
- Erosionen
 - einzelne
 - wenige
 - viele
- Aphten
 - einzelne
 - wenige
 - viele
- Ulcera
 - einzelne
 - wenige

- viele
- konfluierend
- landkartenförmig
- fissural
- flach
- tief
- fibrinbelegt
- Narben
 - einzelne
 - wenige
 - viele
- Haustrierung
 - normal
 - vermindert
 - aufgehoben
- entzündliche Pseudopolypen
 - Einzelne
 - Wenige
 - viele)
- Atrophie
- Fibrinbeläge,Exsudat
- Plaques, Pseudomembranen
 - einzelne,
 - wenige,
 - viele)
- Pflastersteinrelief.

5g. Strahlencolitis:

<u>Chronisch</u>	<u>akut</u>
blasse Mucosa	Ödem
Teleangiektasien	Erythem
Erythem (induriert)	hohe Vulnerabilität
Ulcera	

Induriert

Erosionen

Ulcera.

Freigabevermerk:

Erstelldatum:

Ersteller